



VADEMÉCUM PEDIÁTRICO

Disfruta tu salud



SINUTIL

Acetaminofén 80 mg - Clorfeniramina 0,5 mg / mL
SOLUCIÓN x 30 mL

INDICACIÓN

Tratamiento sintomático
del resfriado común.

POSOLOGÍA

Niños de 2 a 4 años:
60 gotas (2 mL) cada 6 horas.



SINUTIL

Acetaminofén 325 mg - Clorfeniramina 4 mg
Cafeína 32 mg / 15 mL
JARABE x 90 mL

INDICACIÓN

Tratamiento sintomático del resfriado común.

POSOLOGÍA

Niños de 6 a 12 años: 2 cucharaditas
(10 mL) cada 8 horas. Niños mayores
de 12 años y adultos: 1 cucharada
(15 mL) cada 6 a 8 horas.





vincenti. *Disfruta tu salud*

novhepar B12

Vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y B12

JARABE x 90 mL

INDICACIÓN

Suplemento dietético.

POSOLOGÍA

Niños 1 a 3 años: 1 cucharadita al día.

Niños de 4 a 12 años: 1 cucharadita
dos veces al día.

Adultos: 1 cucharadita tres veces al día.

1 cucharadita = 5 mL.



Butropina®

N-butilbromuro de hioscina 5 mg / mL

SOLUCIÓN GOTAS x 20 mL

INDICACIÓN

Tratamiento del dolor
abdominal tipo cólico.

POSOLOGÍA

Niños mayores de 2 años hasta 12 años:

5 mg (1 mL) cada 8 horas.

Dosis máxima: 15 mg/día.



Solunovar[®] Compuesto SOLUCIÓN

Cloruro de cetilpiridinio 0,25 g
Bencidamina clorhidrato 0,15 g / 100 mL
SOLUCIÓN x 30 y 120 mL

INDICACIÓN

Antiséptico y antiinflamatorio
para uso buco-faríngeo.

POSOLOGÍA

Solución: Como tocamiento se emplea
puro, tres (3) veces al día en la zona afectada.
Gargarismo: Una (1) cucharadita en
½ vaso de agua tres (3) veces al día.



ALCOHOL ETÍLICO 70%™ SPRAY

Alcohol etílico 70%
FRASCO SPRAY x 60 y 180 mL

INDICACIONES

Antiséptico, germicida, bactericida, viricida.

POSOLOGÍA

Aplice directamente en manos, piel
expuesta, ropa o cualquier utensilio que desee
desinfectar. Deje secar. No enjuagar.





vincenzi. *Disputa tu salud*

Fugolin[®] CREMA

Clotrimazol 1%
CREMA - USO TÓPICO x 20 g

INDICACIONES

Tratamiento tópico de micosis superficiales. Infecciones dermatológicas causadas por hongos y levaduras. Dermatitis asociada al uso del pañal (pañalitis).

POSOLOGÍA

Adultos y niños: 1 aplicación en la zona afectada 2 veces al día, durante 15 días. Una vez desaparecidas las lesiones, continuar el tratamiento por 10 días para evitar recaídas.



Fugolin[®] SOLUCIÓN

Clotrimazol 1%
SOLUCIÓN - USO TÓPICO x 30 mL

INDICACIONES

Antimicótico de uso tópico.

POSOLOGÍA

Aplicar sobre la(s) zona(s) afectadas 2 o 3 veces al día durante 3 semanas. Una vez desaparecidos los síntomas, continuar el tratamiento por 10 días más para evitar recaídas.



Gencivol®

Bencidamina 0,15% - Lidocaína 0,15%
SOLUCIÓN TÓPICA x 15 mL

INDICACIONES

Calmante, analgésico, anestésico
y antiinflamatorio de la mucosa bucal.

POSOLOGÍA

1 a 2 tocamientos al día sobre
las encías y la mucosa bucal.



LEVOFERIN®

Levodropropizina 30 mg / 5 mL
SOLUCIÓN x 90 mL

INDICACIÓN

Tratamiento sintomático
de la tos no productiva (tos seca).

POSOLOGÍA

Niños de 2 a 5 años de edad: 2 a 3 mL
cada 8 horas. Niños de 6 a 9 años:
3,5 a 5 mL cada 8 horas.

Niños de 10 a 12 años: 5 a 7 mL cada 8 horas.

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mL cada 8 horas.

Tiempo de tratamiento de 5 a 7 días. Adminístrese entre las comidas.





vincenti. *Disputa tu salud*

Otan[®]

Tirotricina 0,1 g - Antipirina 4 g / 100 mL
SOLUCIÓN GOTAS x 5 mL

INDICACIONES

Analgésico y bactericida de uso tópico, en afecciones del conducto auditivo externo y oído medio.

POSOLOGÍA

Instilar 2 a 4 gotas en el conducto auditivo cada 6 horas.



Bevindazol

Albendazol 400 mg / 10 mL
SUSPENSIÓN x 10 mL

INDICACIONES

Antihelmíntico. Infecciones por tenias e hymenolepsis.

POSOLOGÍA

Adultos y niños mayores de 2 años:
400 mg/día dosis única. Infecciones por tenias e hymenolepsis:
400 mg/día por 3 días.





Vincenti.
ALCOHOL
 ETILICO 70%^{vol} **SPRAY**

ANTISÉPTICO

- Piel y superficies.
- Sin agua ni jabón.

No tóxico
 USO EXTERNO

180 mL

Vincenti.
ALCOHOL
 ETILICO 70%^{vol} **SPRAY**

ANTISÉPTICO

Piel y superficies
 Sin agua ni jabón

**CONTIGO
 A DONDE
 VAYAS**

f t i @vincentilab

Material revisado y aprobado por Asesor Médico y Farmacéutico Patrocinante de Laboratorios Vincenti C.A. REF. J400021540-S.
 LEA CUIDADOSAMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL EMPAQUE Y EN CASO DE DUDA CONSULTE AL FARMACÉUTICO.

www.vincentilab.com